

## **FIBRINOGENO**

**GRUPO FARMACOLÓGICO:** B02BB MEDICAMENTO EXTRANJERO

**PRESENTACION:** HAEMOCOMPLETTAN 1G

**RECONSTITUCIÓN:**

Con 50 ml de agua para inyección (API).

Agitar suavemente el vial hasta que esté totalmente disuelto. Una agitación fuerte puede provocar espuma.

El tiempo máximo de dilución es de 15 minutos (generalmente entre 5-10 minutos).

**ADMINISTRACIÓN:**

**INTRAMUSCULAR: NO**

**SUBCUTANEA: NO**

**INTRAVENOSA DIRECTA: NO**

**INFUSIÓN IV INTERMITENTE: SI**

La administración es por vía IV en perfusión muy lenta. Administrar a una velocidad a la que el paciente se encuentre cómodo y nunca sobrepasando los **5 ml/min**.

**INFUSIÓN IV CONTINUA: NO**

**SUEROS COMPATIBLES:** NO

**OBSERVACIONES:**

El vial reconstituido deberá administrarse al paciente a temperatura ambiente o a 37° C. Utilizar el medicamento inmediatamente después de reconstituirlo. No refrigerar una vez reconstituido.

Debe administrarse sólo. Nunca mezclar con otras medicaciones y siempre en una línea de administración separada.