

ATOSIBAN

GRUPO FARMACOLÓGICO: G02CX, OTROS GRUPOS GINECOLÓGICOS

PRESENTACION: TRACTOCILE VIAL 7,5 MG/ML 0,9 ML Y 5 ML

RECONSTITUCIÓN: el vial de 0,9 ml una vez abierto debe utilizarse inmediatamente; el vial de 5 ml debe diluirse cogiendo 10 ml de solución de una bolsa de infusión de 100 ml y desechándolo. Reemplazándolo con 10 ml de TRACTOCILE 7,5 mg/ml concentrado para solución para infusión de dos viales de 5 ml para obtener una concentración de atosiban de 75 mg en 100 ml.

ADMINISTRACIÓN:

INTRAMUSCULAR: NO

SUBCUTANEA: NO

INTRAVENOSA DIRECTA: SI (VIAL 0,9 ML) LENTA (1 minuto)

INFUSIÓN IV INTERMITENTE: NO

INFUSIÓN IV CONTINUA: SI (VIAL 5 ML)

SUEROS COMPATIBLES: SF, G5%; RINGER-LACTATO

OBSERVACIONES:

TRACTOCILE se administra por vía intravenosa en tres etapas sucesivas: una dosis inicial (6,75 mg) en embolada de TRACTOCILE 7,5 mg/ml solución inyectable, seguida inmediatamente de una infusión continua de una dosis elevada (infusión de carga de 300 microgramos/min) durante tres horas de TRACTOCILE 7,5 mg/ml concentrado para solución para infusión, seguida de una dosis menor de TRACTOCILE 7,5 mg/ml concentrado para solución para infusión (infusión de mantenimiento 100 microgramos/min) hasta 45 horas. La duración del tratamiento no debe superar las 48 horas.

Dosis de carga	Infusión 3 horas	Infusión 45 horas
6,75 mg en bolus en 1 minuto	300 mcg /min hasta 3 horas	100 mcg/min hasta 45 horas
1 vial de 6,75 mg	54 mg (2 viales de 37,5 mg)	270 mg (8 viales de 37,5 mg)

La dosis total administrada durante un ciclo completo de tratamiento con TRACTOCILE no debe superar, preferiblemente, los 330 mg de principio activo.