

FOSCARNET

GRUPO FARMACOLÓGICO: J05AD

PRESENTACION: FOSCAVIR 24 MG/ML 250 ML

RECONSTITUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN:

INTRAVENOSA DIRECTA: NO

INFUSIÓN IV INTERMITENTE: SI; La duración de cada perfusión no debe ser inferior a 2 h para dosis de 90 mg/kg o de 1 h para dosis de 60 mg/kg.

INFUSIÓN IV CONTINUA: NO

OTRAS VIAS: NO SE ADMINISTRARA POR VIA DISTINTA DE LA INTRAVENOSA.

SUEROS COMPATIBLES: SF, G5%,

OBSERVACIONES:

Diluir el vial con 250 mL de SF O G5% ; La solución final es de 12 mg/mL si se va administrar por vía periférica; si se administra por vía central puede hacerse si diluir.

Foscavir no contiene conservantes y una vez roto el precinto de esterilidad del frasco la solución debe ser utilizada en un plazo de 24 horas.

Las dosis de Foscavir a dispensar individualmente pueden ser transferidas asépticamente a bolsas de plástico de perfusión por los servicios de farmacia hospitalaria. La estabilidad físico-química de Foscavir y de las diluciones en partes iguales con SF y G5%, en bolsas de PVC, es de 7 días.

BIBLIOGRAFIA:

<https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=59712&formato=pdf&formulario=FICHAS>