



PROTOCOLO DE SOLICITUD DE CEFTOLOZANO-TAZOBACTAM

DATOS DEL PACIENTE

Apellidos.....Nombre.....

Nº Historia Clínica..... Hab/Cama..... Edad.....

Patología de base

CRITERIOS DE UTILIZACION

Pacientes adultos mayores de 18 años con:

1º Infección urinaria complicada:

- Causada por *Pseudomonas* multirresistente sensible a Ceftolozano/Tazobactam.
- Causada por microorganismos Gram negativos productores de carbapenemasas no KPC u OXA y sensibles a Ceftolozano/Tazobactam.
- Causada por microorganismos Gram negativos productores de BLEE y únicamente sensibles a carbapenémicos y Ceftolozano/tazobactam, como segunda opción tras tratamiento con Ertapenem
- Resistente a tratamiento empírico de primera línea en pacientes con antecedentes de ITU por *Pseudomonas* multirresistente.

2º Infección intraabdominal grave nosocomial (asociado a metronidazol si sospecha de patógenos anaerobios):

- Tratamiento dirigido en infecciones intraabdominales graves nosocomiales como alternativa a Imipenem. Valorar de manera individual su posible beneficio en pacientes ancianos, en pacientes con peritonitis y en los sometidos a laparatomía
- Valorar tratamiento empírico sólo si contraindicación de las opciones de primera línea. Indicar contraindicaciones:

.....



POSOLOGÍA, PREPARACIÓN Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Dosis habitual: Ceftolozano/Tazobactam 1g/0,5g cada 8h.

Ajuste en IR: CICr 30-50 ml/min*: Ceftolozano/Tazobactam 500 mg/250 mg cada 8h

CICr 15-29 ml/min*: Ceftolozano/Tazobactam 250 mg/125 mg cada 8h

*Aclaramiento de creatinina estimado utilizando la fórmula de Cockcroft-Gault.

El vial se reconstituye con 10 ml de API o SF al 0,9%. Preparación: Extraiga todo el contenido (aproximadamente 11,4 ml) del vial reconstituido utilizando una jeringa y añádalo a 100 ml de cloruro de sodio al 0,9 % o glucosa al 5 %.

El tiempo de perfusión es de 1 hora.

DURACION

Duración máxima recomendada del tratamiento 7 días.

CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad a cefalosporinas.
- Hipersensibilidad grave a cualquier otro tipo de agente antibacteriano beta-lactámico.

ADVERTENCIAS

- Tazobactam no inhibe enzimas Amp C ni carbapenemasas tipo KPCs, OXA o metallo-beta-lactamasas.
- Ceftolozano/tazobactam contiene 10,0 mmol (230 mg) de sodio por vial.
- Debe conservarse en nevera (entre 2°C y 8°C).

COSTE

Coste diario del tratamiento: 192,48 €

Fecha:

Firma: