

UNIDAD DEL DOLOR AGUDO

PROTOCOLO	1	2	3	4	5
VÍA DE ADMINISTRACIÓN	Epidural	Epidural	Endovenosa	Endovenosa	Endovenosa
PC/PCA	PC (Infusor 5 ml/h) PCA (SF 500 ml)	PC (Infusor 5 ml/h) PCA (SF 500 ml)	PC (Infusor 2 ml/h) PCA (SF 100 ml)	PC (Infusor 2 ml/h) PCA (SF 100 ml)	PC (Infusor 2 ml/h) PCA (SF 100 ml)
COMPOSICIÓN	Bupivacaina 0.1%	Bupivacaina 0.1%	Tramadol 6 mg/ml	Tramadol 6 mg/ml	Morfina 0.3 mg/ml
		Fentanilo 2 mcg/ml	Ketorolaco 1.8 mg/ml	Metamizol 120 mg/ml	Droperidol 0.025 mg/ml
VOLUMEN TOTAL (ML)	500	500	100	100	100
ESTABILIDAD	180 días (Nevera)	1mes +10d (Nevera). Proteger de la luz	7 días (Tª ambiente) Proteger de la luz	7 días Proteger de la luz	14 días (Tª ambiente)
STOCK REA	No	Si (2 infusores)	No	No	No
PETICIÓN	A demanda: L-V antes de 9:30h; 12:30h)	PCA a demanda (Stok REA)	A demanda: L-V antes de 9:30h; 12:30h)	A demanda: L-V antes de 9:30h; 12:30h)	A demanda: L-V antes de 9:30h; 12:30h)

PROCEDIMIENTO:

- ❑ Horarios de petición de infusores a Farmacia (Nuevos y continuaciones):
1º turno: hasta las 9: 30h (L-V).
2º turno: hasta las 12:30h (L-V).
- ❑ Los infusores que se pauten fuera de la franja horaria anterior se elaborarán en la planta de Reanimación.
- ❑ Para las nuevas prescripciones y las continuaciones se escaneará el protocolo de Anestesia al Servicio de Farmacia.