

GANCICLOVIR

GRUPO FARMACOLÓGICO: J05A2A: Antivirales activos contra Herpesvirus.

PRESENTACION: CYMEVENE® 500 mg VIAL.

RECONSTITUCIÓN:

Reconstituir el vial con 10 ml de API y agitar hasta completa disolución. La solución obtenida contiene 50 mg/ml. La solución reconstituida es estable 12 horas a TA . Posteriormente extraer con una jeringa la cantidad necesaria (por ejm. 5ml=250 mg) y disolverla en 100 ml de suero salino 0,9%, Glucosado 5% , Ringer o Ringer-Lactato. La solución así preparada es estable 24 h.

ADMINISTRACIÓN:

INTRAMUSCULAR: NO

SUBCUTANEA: NO

INTRAVENOSA DIRECTA: NO

INFUSIÓN IV INTERMITENTE: SI

Diluir la dosis prescrita en 100-250 ml de SF, G5% y administrar en 60 minutos.

INFUSIÓN IV CONTINUA: NO RECOMENDABLE

No se dispone de información

OTRAS VIAS: INTRAVITREA, INTRATECAL

SUEROS COMPATIBLES: SF, G5%, Ringer o Ringer-Lactato

ESTABILIDAD:

Reconstituido: 12 horas a TA.

Diluido: 24 horas en frigorífico

OBSERVACIONES:

Debido a la elevada alcalinidad de la solución puede producir flebitis. Evitar la ingestión, inhalación o contacto con la piel o las membranas mucosas, tanto del paciente como del personal manipulador. Si el ganciclovir entra en contacto con la piel, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Si entra en contacto con los ojos enjuagar con agua durante al menos 15 minutos.

La reconstitución y preparación debe realizarse en cabina de flujo laminar vertical o de seguridad biológica y con las precauciones habituales de los productos citotóxicos.

El vial debe reconstituirse con API que no contenga parabenos.