

## **FASTURTEC® (RASBURICASA)**

### **GRUPO FARMACOLÓGICO: V03**

### **PRESENTACION: FASTURTEC® 1.5 MG ó FASTURTEC 7.5 MG**

**RECONSTITUCIÓN:** Rasburicasa debe reconstituirse con el volumen completo de la ampolla de disolvente proporcionada (vial con 1,5 mg de rasburicasa a reconstituir con la ampolla de disolvente de 1 ml; vial con 7,5 mg de rasburicasa a reconstituir con la ampolla de disolvente de 5 ml). Tras la reconstitución, se obtiene una solución con una concentración de 1,5 mg/ml de rasburicasa. El volumen requerido de solución reconstituida, obtenido a partir de uno o varios viales, debe diluirse posteriormente con una solución de cloruro de sodio al 9 mg/ml (0,9%) para obtener un volumen total de 50 ml. La concentración en rasburicasa de la solución final para perfusión depende del peso corporal del paciente.

### **ADMINISTRACIÓN:**

**INTRAMUSCULAR: NO**

**SUBCUTANEA: NO**

**INTRAVENOSA DIRECTA: NO**

**INFUSIÓN IV INTERMITENTE: SI. ADMINISTRAR DURANTE 30 MINUTOS**

**INFUSIÓN IV CONTINUA: NO**

**OTRAS VIAS: NO**

**SUEROS COMPATIBLES:** Suero fisiológico al 0,9%.

**ESTABILIDAD:** Se recomienda el uso inmediato después de la reconstitución o dilución. No obstante, se ha demostrado que la estabilidad, tanto después de la reconstitución como de la dilución, es de 24 horas.

**OBSERVACIONES:** El tiempo de perfusión será de 30 minutos. Se administrará una vez al día, hasta 7 días.