

AZTREONAM

GRUPO FARMACOLÓGICO: J01DF Monobactama.

PRESENTACION: AZACTAM® VIAL 1 g, 2 g y 500 mg.

RECONSTITUCIÓN:

Reconstituir el vial de 1 g con su disolvente (4 ml de API. La solución obtenida contiene 250 mg/ml y es estable 48 horas a TA y 7 días en nevera, aunque desde el punto de vista microbiológico no es recomendable guardar más de 24 h.. Al reconstituir puede pasar de incoloro a rosado, esto no indica pérdida de actividad.

ADMINISTRACIÓN:

INTRAMUSCULAR: SI

Reconstituir 1 g con 3 ml de API, 2 g en 8-10 ml de API y 500 mg en 1,5 ml. Inyectar en masas musculares grandes, no necesitándose anestésicos locales.

INTRAVENOSA DIRECTA: SI

Utilizar la presentación de 2 g en 6-10 ml de API y administrar lentamente en un periodo de 3 a 5 minutos.

INFUSIÓN IV INTERMITENTE: SI. ES LA VÍA DE ELECCIÓN.

Diluir la dosis prescrita en 50-100 ml de SF o G5% y administrar en 30-60 minutos.

INFUSIÓN IV CONTINUA: SI ,aunque NO RECOMENDABLE

OTRAS VIAS: NO

SUEROS COMPATIBLES: SF, G5%, G10%, GS, Ringer-Lactato, Ringer, Manitol

ESTABILIDAD:

Las soluciones diluidas, para administrar por vía IM o para perfusión IV, se conservan hasta 48 horas después de su preparación, mantenidas a temperatura ambiente (15 a 30 °C) o 7 días mantenidas en nevera (entre 2 y 6 °C).

OBSERVACIONES: