

## ACETILCISTEINA mucolítico

**GRUPO FARMACOLÓGICO:** R05CB - Mucolíticos

**PRESENTACIÓN:**

FLUMIL® 10% ampollas 3 ml

**RECONSTITUCIÓN:**

No procede

### ADMINISTRACIÓN

**INYECCIÓN IV DIRECTA: SI**

Administrar lentamente

**INFUSIÓN INTERMITENTE: SI**

Diluir la dosis prescrita en 50-100 ml de SG5% y administrar en 15 minutos

**INFUSIÓN CONTINUA: SI**

Diluir la dosis prescrita en 500 ml de Glucosa al 5%

**INYECCIÓN IM: SI**

Administrar lentamente

**SUBCUTÁNEA: NO**

**SOLUCIONES COMPATIBLES:** Glucosa al 5%

### OTRA INFORMACIÓN

**ESTABILIDAD:**

- Para administración parenteral, una vez abiertas las ampollas conservar durante un máximo de 24 h en nevera
- La solución diluida en Glucosa al 5% es estable 60 horas a 25º C

**INCOMPATIBILIDADES:**

- No se ha estudiado su compatibilidad con otros medicamentos, por precaución no debe mezclarse con ningún otro medicamento.

**COMPATIBILIDADES:**

- En caso de necesidad de administración "en Y" con otros medicamentos consultar

al servicio de farmacia.

**FOTOSENSIBLE:** No

**PH:** 6,5 - 7,5

**Electrolitos:** 1,9 mmol (43 mg) por cada ampolla de 3 ml

**OBSERVACIONES:**

- Puede administrarse por vía tópica: por vía inhalatoria como aerosol, en aplicaciones nasales y auriculares, para instilaciones endotraqueales.
- Al abrir la ampolla se aprecia un olor sulfúreo propio del preparado que no trastorna en modo alguno su administración

**Bibliografía:**

- [Prospecto Flumil®](#). Pharmazan S.A.
- [Acetylcysteine](#). En: Trissel's™ 2 Clinical Pharmaceutics Database (Parenteral Compatibility) [base de datos en internet]. Greenwood Village, Colorado: Thomson Reuters (Healthcare) Inc [último acceso el 28 de Septiembre de 2012]. Disponible en: <http://www.thomsonhc.com>
- [Acetylcysteine](#). En: Drugdex [base de datos en internet]. Greenwood Village, Colorado: Thomson Reuters (Healthcare) Inc [actualizado el 28 de Septiembre de 2012]. Disponible en: <http://www.thomsonhc.com>.

**Fecha de actualización:** 10/2012