

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CON CINACALCET

DATOS DEL PACIENTE

Nº historia: _____ EDAD: _____ años; PESO: _____ Kg

Apellidos: _____ Nombre: _____

CRITERIOS DE USO

Criterios de exclusión: Calcio sérico <8,4 mg/dl	SI (NO ELEGIBLE) NO
<p>Diagnóstico:</p> <p>Cinacalcet debería usarse únicamente en pacientes que no cumplan el criterio de exclusión expuesto y que tenga el siguiente diagnóstico además del criterio de uso:</p> <p>Hiperparatiroidismo secundario en pacientes con enfermedad renal crónica y diálisis</p>	NO (NO ELEGIBLE) SI
<p>Criterios de uso</p> <p>IPTH>450 pg/ml a pesar de la restricción dietética de fósforo a <1mg/día y la adición de quelantes del fósforo, incluido sevelamer (Renagel®), a dosis máximas toleradas y vitamina D</p> <p>Como cinacalcet puede disminuir el calcio sérico puede precisarse ajuste de dosis del quelante del fósforo (debería reducirse la dosis de sevelamer o suspenderlo y ajustar las dosis de los quelantes del fósforo basados en calcio)</p>	SI NO (NO ELEGIBLE)
Suspender tratamiento si no hay respuesta a las 16-18 semanas	

POSOLOGIA

Dosis inicial 30 mg/día. Administrar con comida.
Ajustar dosis cada 2-4 semanas. Dosis máxima 180 mg/día

Fecha :

Dr.

Firma

