

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CON PARICALCITOL

DATOS DEL PACIENTE

Nº historia: _____ EDAD: _____ años; PESO: _____ Kg

Apellidos: _____ Nombre: _____

INDICACIONES

Hipercalcemia o hiperfosforemia (o producto Ca*P elevado) mantenidos en tratamiento con Calcitriol IV (Calcijex®) y tratamiento concomitante con quelantes del fósforo

ANALÍTICA (previa a Paricalcitol)

Fecha	Calcio	Fósforo	Ca*P	PTHi	Dosis Calcitriol IV (Calcijet®)	Otros Quelantes del P
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

POSOLOGIA

La dosis inicial de Paricalcitol es aproximadamente 4 veces mayor que la de Calcitriol

$$DI \text{ max. (mcg)} = \frac{\text{nivel basal de hormona paratiroidea intacta (PTHi) en pg/ml}}{120}$$

Guía sugerida de dosis (ajuste de dosis en intervalos de 2 a 4 semanas)

Nivel de PTHi en relación con el nivel basal	Ajuste de dosis de paricalcitol
Iguales o mayores	Aumentar 2 a 4 microgramos
Disminución < 30%	
Disminución ≥ 30% y ≤ 60%	Mantener
Disminución > 60%	Disminuir 2 a 4 microgramos
PTHi < 15,9 pmol/l (150 pg/mL)	

Dr.

Firma



PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CON PARICALCITOL