



PROTOCOLO DE USO: LEVOSIMENDAN (SIMDAX 2.5 MG/ML VIAL 5 ML)

NOMBRE DEL PACIENTE: _____

N.H.C.: _____ EDAD: _____ años; PESO: _____ Kg

POSOLOGÍA:

Dosis de carga 12-24 mcg/Kg durante 10 minutos, seguido de una infusión continua de 0,1 µg/Kg/min.

Transcurridos 30- 60 minutos tras el inicio de la perfusión se debe reevaluar al paciente y disminuir, mantener o aumentar la velocidad de la perfusión (ver tabla) según necesidades.

DURACIÓN MÁXIMA DEL TRATAMIENTO: 24 horas.

DILUCIÓN: 250 ml de suero glucosado 5%

Peso del paciente (kg)	DOSIS DE CARGA (10 min)				PERFUSION (24 horas)					
	Bolo 12 µg		Bolo 24 µg		0,05 µg/Kg/min		0,1 µg/Kg/min		0,2 µg/Kg/min	
	ml	ml/h	ml	ml/h	ml	ml/h	ml	ml/h	ml	ml/h
40	9,6	58	19,2	115	58	2	115	5	230	10
50	12	72	24	144	72	3	144	6	288	12
60	14,4	86	28,8	172,8	86,4	4	172,8	7	345,6	14
70	16,8	101	33,6	201,6	100,8	4	201,6	8	403,2	17
80	19,2	115	38,4	230,4	115,2	5	230,4	10	460,8	19
90	21,6	130	43,2	259,2	129,6	5	259,2	11	518,4	22
100	24	144	48	288	144	6	288	12	576	24
110	26,4	158	52,8	316,8	158,4	7	316,8	13	633,6	26
120	28,8	173	57,6	345,6	172,8	7	345,6	14	691,2	29

CONTRAINDICACIONES DE USO:

- Obstrucción mecánica significativa que afecte al llenado o al vaciado ventricular o a ambos.
- Insuficiencia renal o hepática grave.
- Hipotensión grave y taquicardia.
- Menores de 18 años.

Fecha: _____

Dr. _____

Firma: