



Tabla comparativa: vacunas contra el SARS-CoV-2

	VACUNA COMIRNATY	VACUNA MODERNA	VACUNA ASTRAZENECA
Indicación	Inmunización activa para la prevención del COVID-19 causado por el SARS-CoV-2 en personas ≥ 16 años .	Inmunización activa para la prevención del COVID-19 causado por el SARS-CoV-2 en personas ≥ 18 años .	Inmunización activa para la prevención del COVID-19 causado por el SARS-CoV-2 en personas ≥ 18 años . No administrar en >55 años .
Contenido del envase	Vial multidosis (vidrio de tipo I) de 2 ml con un tapón (goma de bromobutilo sintética) y cápsula de cierre de plástico <i>flip-off</i> con un precinto de aluminio. Cada vial contiene 5 dosis de 0,3 ml tras la reconstitución.	Vial multidosis (vidrio de tipo I) de 5 ml con un tapón (goma de clorobutilo) y cápsula de cierre de plástico <i>flip-off</i> con un precinto de aluminio. Cada vial contiene 10 dosis de 0,5 ml. No necesita diluir.	Vial multidosis (vidrio de tipo I) de 4 o 5 ml con un tapón (elastómero con revestimiento aluminio). Cada vial contiene 8 o 10 dosis de 0,5 ml. No necesita diluir.
Tamaño del envase	195 viales multidosis.	10 viales multidosis.	10 viales multidosis.
Posología y forma de administración	La vacuna se administra como un ciclo de 2 dosis (0,3 ml cada una). Se recomienda administrar la segunda dosis 21 días después de la primera dosis. Vía intramuscular	La vacuna se administra como un ciclo de 2 dosis (0,5 ml cada una). Se recomienda administrar la segunda dosis 28 días después de la primera dosis. Vía intramuscular.	La vacuna se administra como un ciclo de 2 dosis (0,5 ml cada una). Se recomienda administrar la segunda dosis de 28 a 84 días después de la primera dosis. Vía intramuscular.
Precauciones	<ul style="list-style-type: none"> - Precaución en pacientes con coagulopatías/ anticoagulados. - Posponer la vacunación en presencia de enfermedad febril aguda grave/infección aguda (no en infección leve). - No intercambiar a otras vacunas COVID-19. 	<ul style="list-style-type: none"> - Precaución en pacientes con coagulopatías/ anticoagulados. - Posponer la vacunación en presencia de enfermedad febril aguda grave /infección aguda (no en infección leve). - No intercambiar a otras vacunas COVID-19. 	<ul style="list-style-type: none"> - Precaución en pacientes con coagulopatías/ anticoagulados. - Posponer la vacunación en presencia de enfermedad febril aguda grave /infección aguda (no en infección leve). - No intercambiar a otras vacunas COVID-19.
Poblaciones especiales	<ul style="list-style-type: none"> - Pacientes VIH, VHC, VHB: Incluidos pacientes con enfermedad estable. - Embarazadas: Valorar riesgo beneficio. - Población pediátrica: Pendiente resultados. - Lactancia: No hay datos. - Pacientes inmunodeprimidos y con terapia inmunosupresora: Excluidos del EC. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pacientes VIH, VHC, VHB: No hay datos. - Embarazadas: Valorar riesgo beneficio. - Población pediátrica: Pendiente de resultados. - Lactancia: No hay datos. - Pacientes inmunodeprimidos y con terapia inmunosupresora: Excluidos del EC. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pacientes VIH, VHC, VHB: No hay datos. - Embarazadas: Valorar riesgo beneficio. - Población pediátrica: No hay datos. - Lactancia: No hay datos. - Pacientes inmunodeprimidos y con terapia inmunosupresora: Excluidos del EC.
Periodo de validez	<ul style="list-style-type: none"> - Vial congelado: 6 meses (-90°C y -60°C). - Vial descongelado: 5 días (2-8 °C); 2 horas hasta un máximo de 30 °C. - Vial diluido: 6 horas entre 2-30 °C tras la dilución en solución salina fisiológica (0,9%). 	<ul style="list-style-type: none"> - Vial congelado: 7 meses (-25°C y -15°C). - Vial descongelado: 30 días protegido de la luz (2-8 °C); 12 horas (8-25 °C). - Vial perforado: 6 horas entre 8-25 °C desde su perforación inicial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vial refrigerado: 6 meses (2-8°C) - Vial perforado: 48 horas entre 2-8 °C desde su perforación inicial. 6 horas ≤30°C.