El Comité de expertos en el uso de medicamentos de la EMEA ha dado el visto bueno a tres vacunas contra la gripe A (H1N1) y sus fichas técnicas están disponibles (aunque todavía no están comercializadas):

- **FOCETRIA®** de Novartis (29 de septiembre)
- **PANDEMRIX®** de GlaxoSmithKline (29 de septiembre)
- **CELVAPAN®** de Baxter (6 de octubre)

Hasta que se comercialicen, distribuyan y administren a la población (todavía no se conoce fecha exacta), **habrá que estar atentos a las continuas actualizaciones de los datos clínicos de estas vacunas** ya que se están desarrollando ensayos clínicos que aportarán nuevos datos para “la toma de decisiones oportunas y reflexionadas”.

Como no sabemos cual nos tocará, hemos realizado una tabla comparativa de las tres vacunas con los datos más destacables. En las fichas técnicas podemos encontrar todos los ensayos clínicos realizados “no publicados por la premura de tiempo” que determinan la inmunogenicidad de las vacunas.

	Nombre
Fabricante	**FOCETRIA®**
Novartis	**PANDEMRIX®**
GlaxoSmithKline	**CELVAPAN®**
Baxter	
Composición	Antígenos de superficie / Virus fraccionados inactivados / Virus com

Desarrollo	Propagado en huevos embriona	Propagado en huevos embriona	Propagad
Adyuvante	MF59C.1	AS03	Sin adyu
Dosis equivalente de antígeno (HA)/0,5ml	7,5µg	3,75µg	7,5µg
Cepa Variante	A/California/7/2009 (H1N1): (X-179A)	A/California/7/2009 (H1N1): (X-	A/Californ
Ensayos realizados	A/Vietnam/1194/2004 (H5/N1)	A/Vietnam/1194/2004 (H5/N1)	A/Vietnan
Vía administración	Intramuscular		
(se debe acondicionar el recinto de administración por si anafilaxia)			

	Posología		
Adultos (18-60 años)	Una dosis		
Se debería poner una segunda a los 21 días	Una dosis	"puede" ser suficiente	Una dosis
Debe administrarse una segunda a los 21 días			
	Posología		
> 60 años	Una dosis		
Se debería poner una segunda a los 21 días	Una dosis		
Se debe administrar una segunda a los 21 días	Una dosis		
Debe administrarse una segunda a los 21 días			
	Posología		
10 años a 17 años	Una dosis		
Se debería poner una segunda a los 21 días	Una dosis		
Se debe administrar una segunda a los 21 días	Una dosis		
Debe administrarse una segunda a los 21 días			
	Posología		
6 meses a 9 años	Una dosis		
Se debería poner una segunda a los 21 días	Media dosis (0,25ml)		
Se debe administrar otra media dosis	Una dosis		
Debe administrarse una segunda a los 21 días			
	Posología		
	< 6 meses	No está actualmente recomendada	

Datos clínicos	Datos Clínicos serán actualizados de acuerdo con los datos

PD.- El Grupo de Trabajo de Pediatría Basada en la Evidencia (GT-PBE) de la Asociación Española de Pediatría ha realizado una espléndida recopilación actualizada a fecha 5 de octubre de 2009 sobre la inmunización frente a la gripe pandémica (capítulo 5) en "
el informe sobre la gripe pandémica en pediatría
".

Fuente:www.hemosleido.es