

Dos estudios de la norteamericana Clínica Mayo han identificado a la Hepatitis A y B y a la obesidad como nuevos factores de riesgo del cáncer de hígado.

La incidencia de cáncer de hígado se ha triplicado en Estados Unidos en las últimas 3 décadas y a su explicación contribuyen los dos estudios publicados en la edición de enero de 'Mayo Clinic Proceedings.

Para su investigación, el doctor Kim analizó el registro del Hospital de Rochester (Estados Unidos) y halló que la incidencia del cáncer de hígado es de 6,9 por cada 100.000 habitantes, datos superiores a los que el Instituto Nacional del Cáncer norteamericano decretó en su día (5,1 por cada 100.000 personas).

el principal autor del primer estudio y especialista en Gastroenterología y Hepatología, el doctor W. Ray Kim, ha deducido del estudio que el 11 por ciento de los casos de cáncer está relacionado con la obesidad por culpa de la enfermedad de hígado graso. Esto hace pensar al galeno que "las tasas de cáncer de hígado pueden aumentar drásticamente en el futuro debido a la epidemia de obesidad que hay en Estados Unidos".

El otro estudio presentado también señala a la Hepatitis como un factor de riesgo para el cáncer de hígado, pero en este caso en su tipología B. Sin embargo, el principal autor de este informe, Abdirashid Shire, también señala a la Hepatitis C como una de las principales causas de la elevada incidencia de este tumor.

Para Kim, "es importante identificar a las personas con factores de riesgo en determinadas poblaciones, para así ayudar a detectar la enfermedad en sus primeras etapas y poder tratarlas".

Fuente: europa press 4 de enero del 2012