

Las principales recomendaciones incluidas en la guía son:

- A los pacientes y a los cuidadores se les debe ofrecer claramente, información y consejo constantes durante todas las etapas de su cuidado. Esto debe incluir los riesgos de infecciones de sitio quirúrgicas, qué se está haciendo para reducirlas y cómo se manejan. A los pacientes se les debe de dar profilaxis antibiótica antes de cirugía limpia que implica la colocación de una prótesis o de un implante, cirugía limpia-contaminada y cirugía contaminada.
- La profilaxis antibiótica no debe utilizarse rutinariamente para la cirugía no complicada no protésica limpia.
- La piel del paciente se debe preparar en el sitio quirúrgico inmediatamente antes de la incisión usando una preparación (acuosa o a base de alcohol) antiséptica con povidona yodada o clorhexidina que es la más conveniente.
- El rasurado del pelo no se debe utilizar rutinariamente para reducir el riesgo de infección quirúrgica del sitio. Sin embargo si el pelo tiene que ser quitado, las maquinillas eléctricas principales de un solo uso se deben utilizar el día de la cirugía. Las maquinillas de afeitador no se deben utilizar para el rasurado, porque aumentan el riesgo de infección quirúrgica del sitio.

Para ampliar información pinchar [aquí](#) .